

# Es darf gesät werden.

## Hafer

	Spelzenfarbe	Reife	Reifeverzögerung des Strohs	Pflanzenlänge	Neigung zu		Anfälligkeit für		Ertragseigenschaften	
					Lager	Halmknicken	Mehltau	Kronenrost	TKG	Kornertrag Stufe 2
Aragon	gelb	4	3	4	6	6	5	5	6	5
Dominik	gelb	5	5	4	4	4	5	4	6	6
Flocke	weiß	5	4	4	4	4	7		6	6
Max	gelb	4	4	4	6	6	5		6	7

## Sommergerste

	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Neigung zu		Mehltau	Anfälligkeit für			Ertragseigenschaften	
				Halmknicken	Ährenknicken		Netzflecken	Rhynchosporium	Zwergrost	TKG	Kornertrag Stufe 2
Grace	5	3	4	4	4	4	4	5	4	7	8
Marthe	5	3	5	4	4	2	4	5	5	5	6
Quench	6	3	4	4	3	2	5	4	6	5	7
Simba	5	2	4	4	5	2	4	4	3	6	7

## Sommerweizen

	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Anfälligkeit für				Ertragseigenschaften		
						DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Spelzenbräune	TKG	Kornertrag Stufe 2
Triso	5	5	4	5	5	5	9	6	4	3	5	5
SW Kadrij	4	4	3	3	4	5	3	2	5	4	7	5

## Durumweizen

	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Anfälligkeit für				Ertragseigenschaften	
						Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Spelzenbräune	TKG	Kornertrag Stufe 2
Duroflavus	5	4	4	3	4		5			5	5
Miradoux	5	4	4	3	5	3	5	5	3	8	7